

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

Δελτίο Ν° 15

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδερμίδα: Επανάληψη ψεκασμού σε μεσοπρώιμες περιοχές και σε μεσοπρώιμες ΠΕ Χανίων.*

Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Ευαίσθητα στάδια.




Περουόσπορος: Εξέλιξη περιορισμένη. Προσοχή σε θέσεις με πρωινές δροσιές.

Τζιτζικάκι: Συνεχής αύξηση πληθυσμών. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.


Πλανόκοκκος: Έλεγχος στα επιτραπέζια πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.

*Σε συνεργασία με την Δ.Α.Ο.Κ. και οινοποιεία του νομού Χανίων.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggjolini			
		Στάδιο Κ ανάπτυξη ρωγών - κατακόρυφη θέση		Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών
		Πρώιμη ζώνη		Τα σταφύλια κλείνουν
		Μεσοπρώιμη	κατακόρυφη θέση - κλείσιμο σταφυλιών	
Όψιμη ζώνη	ανάπτυξη ρωγών-κατακόρυφη θέση			

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υψηλή σχετική υγρασία) έχουν ευνοήσει την δραστηριότητα του εντόμου.
- Η διάρκεια της πτήσης εμφανίζεται παρατεταμένη και συνεχίζουν να καταγράφονται δυναμικοί πληθυσμοί και αυξημένες ωοτοκίες.

Οδηγίες :

Συστήνεται επανάληψη του ψεκασμού στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Μεσοπρώιμες περιοχές	• Επιτραπέζια : 24 - 25 Ιουνίου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 25 - 26 Ιουνίου

Μεσοπρώιμες ΠΕ Χανίων	• 23 - 25 Ιουνίου
------------------------------	--------------------------

Λόγω της παρατεταμένης δραστηριότητας (συλλήψεις, ωοτοκίες) συστήνεται επανάληψη ψεκασμού και στα οινάμπελα - σουλτανίνα στην ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και στην κάτω Μεσσαρά στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Ενδιάμεση ζώνη και κάτω Μεσσαρά	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 22 - 23 Ιουνίου
----------------------------------------	---------------------------------------------------

Σημείωση. Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών εκτός από τον σωστό χρόνο και τα μέσα εφαρμογής προϋποθέτει και την **καλή κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό**. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μολύνσεις και την εξάπλωση της ασθένειας.

Οδηγίες :

- Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(*Plasmopara viticola*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι καιρικές συνθήκες που προβλέπονται στις επόμενες ημέρες (άνοδος θερμοκρασίας, χαμηλή σχετική υγρασία) δεν ευνοούν τον μύκητα εκτός από τις θέσεις που συνεχίζουν να σημειώνονται δροσιές και έχει εμφανιστεί η ασθένεια.

Οδηγίες :

- Τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα στις θέσεις που συνεχίζουν να σημειώνονται δροσιές.

Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με το ωίδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:
(*Empoasca spp*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Εμφανίζονται συμπτώματα στα φύλλα, καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα του εντόμου στα αμπέλια (τέλεια, νύμφες) και οι πληθυσμοί αυξάνουν συνεχώς.

Οδηγίες :

- Να γίνεται έλεγχος στην κάτω πλευρά των φύλλων. Σε περίπτωση αυξημένων πληθυσμών (όριο επέμβασης 50 - 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα) μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ:
(*Planococcus ficus*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (εμφάνιση καπνιάς και κόλλας κοντά στη συγκομιδή).
- Τα σταφύλια σταδιακά αρχίζουν να κλείνουν.

Οδηγίες :

- Να ελέγχονται τα αμπέλια, ιδιαίτερα αυτά με ιστορικό προσβολών. Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών βοηθά στον εντοπισμό του.

- Σε **επιτραπέζια σταφύλια που μετά από έλεγχο εντοπίζονται πληθυσμοί** να γίνει επιμελημένος ψεκασμός. Η αντιμετώπιση του εντόμου μετά το κλείσιμο των σταφυλιών είναι πολύ δύσκολη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [πλανόκοκκο πατήστε εδώ](#)

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 21 Ιουνίου 2017

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη